

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Anis-Pyrit jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Anis-Pyrit und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Anis-Pyrit beachten?
3. Wie ist Anis-Pyrit einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Anis-Pyrit

Tabletten



WELEDA

1. Was ist Anis-Pyrit und wofür wird es angewendet?

Anis-Pyrit ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Heiserkeit, Begleitbehandlung bei Bronchitis, Luftröhrentzündung, Kehlkopfentzündung.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Anis-Pyrit Tabletten beachten?

Anis-Pyrit Tabletten dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Anis, Anethol, Weizenstärke oder einem der sonstigen Bestandteile sind.
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu einem Jahr.
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Doldengewächse (Apiaceen).

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, bei Atemnot, bei eitrigem oder blutigem Auswurf sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Anis-Pyrit in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Anis-Pyrit Tabletten

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Weizenstärke kann geringe Mengen an Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

3. Wie ist Anis-Pyrit einzunehmen?

Nehmen Sie Anis-Pyrit Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: alle 2 Stunden 1 Tablette.

Kleinkinder von 2 – 5 Jahren: 3 – 5 mal täglich 1 Tablette, ggf. in etwas Tee aufgelöst.

Lassen Sie die Tablette im Mund zergehen.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 - 5 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Anis-Pyrit vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Anis-Pyrit Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Aufgrund des Bestandteiles Pimpinella anisum können gelegentlich allergische Reaktionen der Haut, der Atemwege und des Magen-Darm-Traktes auftreten. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung

1 Tablette enthält: Wirkstoff: Anis-Pyrit Trit. D2 (HAB, SV 6) 25 mg.

[1 g Anis-Pyrit Ursubstanz enth.: Pimpinella anisum, Fructus tostus 0,33 g / Pyrit 0,33 g / Saccharum tostum 0,34 g.]

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Weizenstärke, Calciumbehenat.

Darreichungsform und Packungsgröße

80 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Februar 2010